

ALFALFERO

FICHA TÉCNICA

EMPRESA: Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

PRODUCTO: ALFALFERO® - Fertilizante foliar líquido



I. INGREDIENTES ACTIVOS:

• Nitrógeno	200 g/L
• Zinc	3.38 g/ L
<u>MICROELEMENTOS</u>	
• Magnesio	1.60 g/L
• Fierro	1.30 g/L
• Cobre	1.25 g/L
• Ácidos carboxílicos	3.0 %
• Aminoácidos	1.0 %
• Auxinas	250 ppm
• Giberelinas	200 ppm
• Carbohidratos	4.5%
• Solventes c.s.p.	1 L

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Líquido
• Color	Verde petróleo
• Olor	Acaramelado
• Densidad	1.4 +/- 0.2
• PH	1.3 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosivo
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

IV. MODO DE ACCION

ALFALFERO® es un fertilizante foliar líquido concentrado con un contenido en Fósforo (P), (N), y Zinc (Zn), balanceado con aminoácidos y fitohormonas más microelementos, de acuerdo a la curva de absorción de los cultivos lo que permite aplicarlo en el momento adecuado para obtener una máxima producción.

Esta formulado específicamente para corregir las deficiencias nutricionales de los cultivos en condiciones de suelos áridos. Además de los activadores metálicos de hormonas de crecimiento que favorecen el desarrollo celular de los tejidos, como también posee los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas en condiciones de climas fríos.

ALFALFERO® viene acompañado de microelementos, los mismos que proporcionan a los cultivos en general los elementos necesarios para su normal desarrollo, corrigiendo deficiencias de los mismos.

V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	EN 200 LITROS DE AGUA	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIÓN
Alfalfa Maíz forrajero Sorgo Avena	1 a 2 L	1ra Aplicación 10 días después del brotamiento o del transplante 2da Aplicación 10 días de la primera aplicación
Papa Camote Zanahoria	1 a 2 L	1ra Aplicación 10 días después del brotamiento o del transplante 2da Aplicación 10 días de la primera aplicación
Tomate, Ají, Pimiento, Páprika, Alcachofa, Espárrago	1 a 2 L	1ra Aplicación 10 días después del brotamiento o del transplante 2da Aplicación 10 días de la primera aplicación.
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano	1 a 2 L	1ra Aplicación 10 días después del brotamiento o del transplante 2da Aplicación 10 días de la primera aplicación
Cebolla Ajo Apio, Poro Nabo,	1 a 2 L	1ra Aplicación 10 días después del brotamiento o del transplante 2da Aplicación 10 días de la primera aplicación

VI.

VI.

VI.

MOMENTO DE APLICACIÓN

ALFALFERO® se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo y como apoyo, en la floración y aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos.

VII. COMPATIBILIDAD

ALFALFERO® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

ALFALFERO® es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

