



AGRODISER Ca-24

FICHA TÉCNICA

EMPRESA: Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

PRODUCTO: AGRODISER Ca-24®

I. INGREDIENTES ACTIVOS:

• Oxido de calcio	24.0%
• Nitrógeno	14.0%
• Magnesio (Mg)	2.0%
• Microelementos	1.0%
• Ácidos Carboxílicos	2.0%
• Aminoácidos	3.0%

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Líquido
• Color	Amarillo
• Olor	Neutro
• Densidad	1436
• PH	2.04
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosiva
• Corrosividad	No corrosiva
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la mezcla	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

IV. MODO DE ACCION

AGRODISER Ca-24® se encuentra en las paredes celulares de los tejidos vegetales, transportado por la vía xilemática, cuya disponibilidad está relacionada directamente con la transpiración de la planta, neutraliza ácidos orgánicos, tóxicos, producto de la respiración celular y favoreciendo la estabilidad de la membrana y desarrollo de procesos metabólicos.

V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONCENTRACIÓN	DOSIS
	ML/200 L	NUMERO DE APLICACIONES
Uva de mesa: Red Globe, Italia, Torontel, Quebranta, Mollar y Otras	500 ml	Al inicio de brotación y repetir a intervalos de 21 días
Frejol, haba soya	500 ml	Inicio de formación de vainas y repetir cada 15 días
Olivo, mango y palto	500 ml	Inicio de formación de frutos repetir cada mes hasta cosecha.
Tomate, ajíes (Pimiento, Paprika, Panca piquillo, escabeche y rocoto)	500 ml	Inicio de floración y durante la fructificación cada 15 a 20 días
Papa, camote y tubérculos andinos	500 ml	Inicio de formación de tubérculos repetir cada 15 días
Quinoa, Avena, arroz, cebada, trigo.	500 ml	Al macollamiento y durante formación de fruto
Zapallo, sandia, melón, alcachofa, esparrago	500 ml	Inicio de floración y formación de fruto repetir cada 15 días
Plátano	500 ml	Inicio de floración del botón y durante la floración.

VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

AGRODISER Ca-24® se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo, en la floración y aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos. Aplicación foliar: Aplicar de acuerdo con la dosis recomendada para cada tipo de cultivo con equipos de pulverización convencional.

VII. COMPATIBILIDAD

AGRODISER Ca-24® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

AGRODISER Ca-24® es un corrector de carencias de calcio muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.