

MOTSUKI

FICHA TÉCNICA

I.

EMPRESA: Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

PRODUCTO: MOTSUKI®

I

INGREDIENTES ACTIVOS:

• Fuente:	Ascophyllum nodo sum
• Solubilidad en agua	100%
• Ácido algínico	19%-21%
• Materia Orgánica	50%-70%
• Nitrógeno(N)	0,5%-2%
• Fosforo(P2O5)	0,5%-2%
• Potasio(K2O)	16%-18%
• PH	8-10
• Hormonas vegetales naturales totales	>300ppm

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

III. COMPOSICION

• Estado	Físico Líquido
• Color	Marrón oscuro
• Olor	Acaramelado
• Densidad	1.1 +/- 0.2
• PH	7 -10
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosivo
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

IV. FORMULACIÓN

Líquido

V. MODO DE ACCIÓN

- **MOTSUKI (Algas marinas)** puede hacer que los cultivos maduren antes, aumentar el rendimiento y mejorar la calidad, y juegan un papel importante en la conservación de la fruta y la resistencia a plagas y enfermedades, lo que puede aumentar la producción en un 10-30%.
- **MOTSUKI (Algas marinas)** en flores, se demuestra que el fertilizante de algas marinas florece temprano, el número de los botones florales aumentan significativamente, y la tasa de aumento es del 30-60%.
- **MOTSUKI (Algas marinas)** en campo muestran que la tasa de rendimiento del cultivo es de alrededor del 30%.

VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

MOTSUKI (Algas marinas) Aspersión de la solución en la hoja, rocíe uniformemente en toda la planta

VII. DOSIS Y APLICACIÓN

DOSIS Y APLICACIÓN CULTIVO	DOSIS/Ha	Nº Apli.	EPOCA
Uva (mesa)	1.0-2.0	2	1º Antes de la floración 2º Después de la floración
Uva (vinífera)	0.5-1.0	3	1º Aplicación al brote de 15 cm 2º Aplicación al brote de 40 cm 3º Inflorescencia hinchada
Manzano, peral	0.5-1.0	2	1º En caída de pétalos. melocotonero, palto 2º Con fruto cuajado
Cucurbitáceas Zapallo	0.5-1.0	2-4	1º Aplicación en pre floración y melón, sandía. repetir a los 15 y 30 días
Tomate, pimiento	0.5-1.0	3	1º Aplicación en inicio de la paprika, piquillo floración, repetir cada 20 días
Ajo	0.5-1.0	3-4	1º aplicar 15 días después de la siembra, repetir cada 15 días
Cebolla roja	0.5-1.0	3-4	1º aplicar 15 días después del Cebolla blanca trasplante, repetir cada 15 días
Alcachofa, lechuga, col, apio	0.5-1.0	3	Aplicar 15-20 días espinaca, esparrago después del trasplante, acelga repetir cada 15 días
Zanahoria, nabo, poro	0.5-1.0	3	Aplicar 15-20 días betarraga, culantro después del trasplante, a repetir cada 15 días
Papa	0.5-1.0	2	1º Aplicación al aporque. 2º Inicio de floración
Flores de corte	0.5-1.0		Aplicar luego de cada. corte, al inicio de la nueva. floración

Almacenamiento:

Almacenamiento fresco, seco y sellado lejos de la luz solar directa.

Duración:

Tres años desde la fabricación

Nota :

Evite el contacto con fertilizantes ácidos, para no afectar la calidad del producto

VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS:

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Agro distribuciones y Servicios del Sur S.R.L. no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

MOTSUKI® es un fertilizante foliar muy seguro, pero por norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

