

AGRODISER ZINC

FICHA TÉCNICA

I.

I.

EMPRESA: Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.

I.

PRODUCTO: AGRODISER ZINC® - Fertilizante foliar liquido

I.

I.

INGREDIENTES ACTIVOS:

• Zinc	85 g/L
• Nitrógeno	100 g/L
• Azufre	15 g/L
• Magnesio	20 mg/L
• Fierro	40 mg/L
• Cobre	50 mg/L
• Manganeseo	5 mg/L
• Ácidos carboxílicos	5 %
• Aminoácidos	3 %
• Fitohormonas	200ppm
• Carbohidratos	5 %
• Precusores hormonales (Extracto de microorganismos)	110 g/L
• Solventes c.s.p.	1 L

II. CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

• Estado físico	Liquido
• Color	Cafe
• Olor	Acaramelado
• Densidad	1.4 +/- 0.2
• PH	1.3 +/- 0.1
• Solubilidad en agua	100 % soluble
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosiva
• Corrosividad	No corrosiva
• Combustibilidad	No combustible
• Estabilidad de la solución	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

III. FORMULACIÓN

Concentrado Soluble.

IV. MODO DE ACCION

AGRODISER ZINC® es un fertilizante foliar líquido concentrado con un contenido en Fósforo (P), Potasio (K) y (N), balanceado más microelementos que ayudan a mejorar el proceso de fotosíntesis y la calidad final de los productos a cosecha; pues induce y estimula la multiplicación de los todos los órganos de la planta hojas, tallo, raíces, florales y fruteros; asegurando un desarrollo adecuado del cultivo.

V. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	EN 200 LITROS DE AGUA	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIÓN
Papa	1 a 2 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo del estolón y tuberización.
Algodón	1 a 2 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo floración y desarrollo de la bellota.
Tomate, Ají, Pimiento, Páprika, Alcachofa, Espárrago	1 a 2 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Fríjol, Vainita, Arveja+Pallar, Garbanzo	1 a 2 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano	1 a 2 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, floración y desarrollo del fruto
Apio, Poro Nabo, Ajo, Cebolla	1 a 2 L	1º Durante todo el periodo vegetativo de la panta desarrollo, formación del bulbo.

VI. MOMENTO DE APLICACIÓN

AGRODISER ZINC® se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo, en la floración y aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos.

VII. COMPATIBILIDAD

AGRODISER ZINC® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común; sin embargo, antes de hacer una mezcla, deben realizarse ensayos previos.

VIII. TOLERANCIAS Y CARENCIAS

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa, **Agrodistribuciones y Servicios del Sur S.R.L.** no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

AGRODISER ZINC® es un fertilizante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.

